

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-4-12-79196991

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

### SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : 86-36-24

## ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

M. le Sous-Régisseur de recettes  
de la Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

BULLETIN TECHNIQUE N° 278

3 DECEMBRE 1979

### PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

/ CEREALES /

Avec les températures plus douces enregistrées ces derniers jours un nouveau développement des colonies de pucerons est observé dans les cultures ayant levé avant le début du mois de Novembre.

Le seuil d'intervention, deux plantes sur trois porteuses d'au moins un puceron, est atteint dans de nouvelles parcelles notamment dans le département d'Eure-et-Loir en Beauce Dunoise et dans le Faux Perche.

D'une manière générale un nouveau contrôle est nécessaire dans toutes les cultures qui présentaient, début Novembre, plus de 20 % de leurs plantes colonisées.

En cas d'intervention, pour des raisons d'efficacité et de sélectivité, il convient de préférer les insecticides à base de BROMOPHOS (Sovinexon 25, Rhodianex et Nexlon EC 40) ou une PYRETHRINE DE SYNTHÈSE (Ambush; Decis, Perthrine ou Sumicidine).

Enfin, nous rappelons que :

- plus on avance en saison, plus le pouvoir infectieux des pucerons est grand.
- seules de fortes gelées avec des températures inférieures à - 10°C pendant plusieurs jours assurent une destruction pratiquement complète des colonies de pucerons.

### GROSSE ALTISE

/ COLZA /

Les derniers sondages confirment les indications contenues dans le Bulletin Technique du 23 Novembre. Des interventions sont parfois nécessaires pour les cultures semées précocement dans le département de l'Indre, en BEAUCE dans le département de Loir-et-Cher et dans la région d'Orléans (45).

### CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

En complément du bulletin technique du 23 Novembre, il convient également de signaler la présence de cet insecte dans le département du Cher dans les régions de CHAROST et de SAINT CAPRAIS.

### FUSARIOSE DES EPIS

/ MAIS /

Des attaques très importantes de Fusariose sont observées actuellement sur les épis conservés en cribs notamment dans les régions de CHATEAUDUN (28) et de PITHIVIERS (45). La variété Royal 255 semble particulièrement affectée.

.../...

P 378

Le développement de cette moisissure rose sur les épis a été favorisé par les fortes attaques de pyrale et les conditions climatiques douces et humides observées durant la récolte. Une aggravation de la situation est à craindre si l'humidité de l'air reste aussi élevée et si les températures moyennes se maintiennent au-dessus de 2 à 3°C.

Outre les pertes en matière sèche, les lots atteints risquent d'être dépréciés.

En conclusion, une surveillance des cribs est nécessaire, en présence de nombreuses pourritures il est préférable de battre sans attendre.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de La Circonscription Phytosanitaire "CENTRE"

G. BENAS